HERALDO
DE ARAGON

Nº y fecha de publicación : 120112 - 12/01/2012
Difusión : 48615
Periodicidad : Diario
HERAoN1ES_120112_23_9.pdf
VPB : 1440€
Web Site: http://www.heraldo.es/
Página : 23
Tamaño : 90 %
315 cm2

Los pediatras piden adelantar la vacuna del sarampión tres meses por el repunte de casos

La Asociación Española de Pediatría aconseja que la segunda dosis se administre a los dos años, y no entre los tres y los cuatro

MADRID. Los pediatras aconsejaron ayer adelantar la administración de las dosis de la vacuna del sarampión (la triple vírica) ante el repunte de casos que se detectó el pasado año en España: cerca de 2.000, aunque se sospecha que pudieron llegar hasta más de 3.000, frente a los 173 de 2010.

Esa es la recomendación del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, cuyos miembros abogaron por adelantar a los 12 meses la primera dosis de esta vacuna, que actualmente se aplica a los 15 en la mayoría de las comunidades.

La razón es que se han detectando casos de sarampión entre los 12 y 15 meses, ya que los menores de esa edad tienen una insuficiente cantidad de anticuerpos, según David Moreno, coordinador del Comité Asesor.

Además, los pediatras aconsejan que la segunda dosis se ponga antes: actualmente se administra entre los tres y cuatro años y en algunas comunidades, a los seis.

La mejor edad para poner esa dosis sería los dos años, porque se ha producido un «resurgir del sarampión» en toda Europa, donde el año pasado se detectaron más de 30.000 casos, ocho personas murieron por la enfermedad y 25 acabaron con encefalitis, según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades Infecciosas.

En España, según este organismo, se contabilizaron oficialmente entre enero y octubre del pasado año 1.876 casos, pero se sospecha que pudieron ser más de 3.000, y de ellos unos 2.000 en Sevilla. Moreno justificó este brote alrededor de la capital andaluza porque la enfermedad se desarrolló en personas con una cobertura baja de vacunación, posiblemente de etnia gitana, y en pueblos pequeños. El resto de casos se dio, en su mayoría, en Madrid y Barcelona.

Los especialistas achacan el repunte a que ha descendido la cobertura de vacunación hasta el 85% por ciento de los candidatos a ella, cuando lo óptimo para que se bloquee una enfermedad es que se cubra hasta el 95%.

La cobertura ha descendido «llamativamente» y lo ha hecho debido a varias causas, entre ellas la «relajación natural» de los padres y la disminución de visitas de los niños al pediatra a partir de los dos años, y a que muchas de las madres gestantes no han sufrido esta enfermedad y se olvidan de que el sarampión «mata», según Javier Arístegui, miembro del Comité Asesor de Vacunas.

Otro factor que ha influido es la campaña «fraudulenta» que realizó una publicación del Reino Unido, que vinculó la vacuna del sarampión con el autismo, según este especialista. También, la tendencia hacia una vida naturista de algunas personas, que piensan que «lo normal es pasar las enfermedades y no vacunarse».

No obstante, España tiene una cobertura favorable, según el Comité Asesor de Vacunas, que subrayó la necesidad de que exista un único calendario de vacunación porque desde el punto de vista técnico «no existe una motivación» para hacer tantas como comunidades. El Comité recomendó también que se administre una dosis más de la vacuna contra la tosferina (seis en vez de cinco), y que la última sea entre los 11 y 14 años.

AGENCIAS/HERALDO

PARA SABER MÁS...

http://vacunasaep.org
Web del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

BERBÉS ASOCIADOS
Consultores de Comunicación