

SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

GRUPO DE EDAD: INFANCIA 0-13 años

- ≠≠ Servicio de Educación para la Salud y Promoción de Autocuidados en la Infancia
- ≠≠ Servicio de Valoración y Desarrollo pondero-estatural y psicomotor
- ≠≠ Servicio de Vacunaciones infantiles.
- ≠≠ Servicio de Detección precoz y Prevención en la Infancia: Metabolopatías congénitas, Displasia evolutiva de cadera, Criptorquidia, Alteraciones de la audición, Anomalías oculares y de la visión.

GRUPO DE EDAD: ADOLESCENCIA 14-19 años

- ≠≠ Servicio de Educación para la Salud y Promoción de Autocuidados en Jóvenes

GRUPO DE EDAD: PERSONAS ADULTAS 20-74 años

- ≠≠ Servicio de Educación para la Salud y Promoción de Autocuidados en Personas Adultas
- ≠≠ Servicio de Salud Sexual y Reproductiva y Detección Precoz de Cáncer de Mama y Cérvix
- ≠≠ Servicio de Atención al Climaterio y Postmenopausia
- ≠≠ Servicio de Detección precoz de Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular

GRUPO DE EDAD: PERSONAS MAYORES ? 75 años

- ≠≠ Servicio de Prevención y Detección de Problemas en el Anciano

GRUPO DE EDAD: POBLACION GENERAL

- ≠≠ Servicio de Inmunizaciones no sistemáticas: Tétanos, Gripe, Hepatitis B

PROMOCION Y PREVENCION. GRUPO DE EDAD: INFANCIA 0-13 años
SERVICIO

EDUCACION PARA LA SALUD Y PROMOCION DE AUTOCUIDADOS EN LA INFANCIA

DEFINICION

Incluye actividades de promoción de la salud y prevención destinadas a la población infantil y a sus madres, padres y tutores, con el objetivo de mejorar la salud de esta población y prevenir enfermedades evitables. Incluye actividades sobre la Promoción de la Lactancia materna, Prevención de la muerte súbita del lactante, Prevención de accidentes y Promoción de hábitos de vida saludables.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

- ≠ ≠ Promoción de la lactancia materna: La leche humana es el alimento de elección durante los primeros 6 meses de vida. Se realizará educación para la salud de las madres y los padres en los sucesivos controles hasta el año de edad, para apoyar y fomentar la lactancia materna con aportación de información escrita siguiendo las recomendaciones de la guía clínica del servicio
- ≠ ≠ Prevención del Síndrome de Muerte súbita del lactante: La muerte súbita del lactante se define como la muerte de un niño menor de un año de edad a la que no se encuentra explicación después de una investigación minuciosa del caso incluyendo la realización de la autopsia completa. Se proporcionará Educación para la salud a las madres y a los padres en los sucesivos controles según las normas de la guía clínica hasta el año de edad, sobre la posición durante el sueño, papel del tabaquismo pasivo, consejos medioambientales y lactancia materna.
- ≠ ≠ Prevención de accidentes: Las lesiones traumáticas accidentales constituyen la primera causa de muerte entre el año y los cuarenta años de edad. Se aportará Educación para la salud en los sucesivos controles a los padres y madres de los niños sobre las precauciones a tomar para evitar accidentes, con aportación de folletos explicativos.
- ≠ ≠ Promoción de hábitos de vida saludables: Educación para la salud a las madres y a los padres y niños en los sucesivos controles sobre alimentación, higiene y cuidados generales, protección solar, salud bucodental, tabaquismo pasivo y hábitos tóxicos, sueño y control de esfínteres, ejercicio físico y evitación del sedentarismo., promoción del buen trato y evitación del maltrato infantil.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad:
Lactancia materna: 0-1 años de edad
S. Muerte súbita del lactante: 0-1 años de edad
Accidentes: 0-13 años
Hábitos de vida saludables: 0-13 años
años de edad

POBLACION DIANA

Población de 0-1 años: Lactancia materna, S. Muerte súbita del lactante
Población 0-13 años años: Accidentes, Hábitos de vida saludables

SISTEMA DE REGISTRO

OMI

INDICADORES

COBERTURA EFECTIVA

- % niños/as con las actividades de Promoción de la salud y Prevención indicadas para su edad realizadas en relación a la población diana estimada
- % niños/as con Educación para la Salud a sus madres /padres sobre lactancia materna
- % niños/as con Educación para la Salud a sus madres /padres sobre prevención del S. Muerte súbita
- % niños/as con Educación para la Salud, y a sus madres/padres sobre accidentes
- % niños/as con Educación para la Salud, y a sus madres/padres, sobre hábitos saludables

CALIDAD

CONTROL DE PROCESO

RESULTADOS INTERMEDIOS

SERVICIO

VALORACION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO EN POBLACION INFANTIL

DEFINICION

Valoración y seguimiento del crecimiento y desarrollo físico de la población infantil, así como del desarrollo psicomotor, con el objetivo de detectar y prevenir trastornos o enfermedades derivadas de un inadecuado desarrollo

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Incluye, al menos, las siguientes actividades, según recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Servicio :
≠≠ Monitorización de 9 controles del Peso, Talla, Índice de Masa Corporal y Perímetro cefálico en los 2 primeros años de edad, y peso /talla /IMC en 4 controles desde los 2 años hasta los 14 años de edad. Desarrollo puberal a los 6, 10 y 13 años
≠≠ Anamnesis y exploración del desarrollo psicomotor en los 2 primeros años de edad y controles entre los 2 y 6 años de edad.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad:
Desarrollo pondo-estatural: 0-13 años
Desarrollo psicomotor: 0-6 años
Desarrollo puberal: 6-13 años

POBLACION DIANA

Población de 0-13 años (D. Pondo-estatural)
Población de 0-6 años (D. Psicomotor)

SISTEMA DE REGISTRO

OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños/as con las actividades de Valoración y seguimiento del desarrollo indicadas para su edad realizadas en relación a la población diana estimada
% niños/as con las actividades de Valoración y seguimiento del desarrollo pondo-estatural indicadas para su edad realizadas en relación a la población diana estimada
% niños/as con las actividades de Valoración y seguimiento del desarrollo psicomotor indicadas para su edad realizadas en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

DETECCION PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN POBLACION INFANTIL: METABOLOPATIAS CONGENITAS, DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA, CRIPTORQUIDIA, ALTERACIONES DE LA AUDICION, ANOMALIAS OCULARES Y DE LA VISION

DEFINICION

Cribaje sistemático para la detección de los problemas de salud en población infantil, con presentación de inicio en las distintas edades, , en coordinación con Atención Especializada, que puedan beneficiarse de una detección temprana, con el objetivo de prevenir enfermedades. Incluye actividades de Detección Precoz de Metabolopatías congénitas, Displasia evolutiva de la cadera, , Criptorquidia, Alteraciones de la audición, Anomalías oculares y de la visión.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Incluye, al menos, las siguientes actividades, según recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Servicio :

- ≠≠ Detección Precoz de Metabolopatías: Toma de muestra de sangre sistemática a todo recién nacido entre el 3° y 8° día de vida, para determinación de TSH y fenil-alanina,
- ≠≠ Detección Precoz de Displasia evolutiva de cadera: Exploración de cadera en todos los controles de salud del niño/a, al menos 4 en el primer año de edad.
- ≠≠ Detección Precoz de Criptorquidia: Realizar exploración testicular en los controles de salud del niño, al menos 3 veces en el primer año de edad.
- ≠≠ Detección Precoz de Alteraciones de la Audición: Registro de antecedentes de riesgo, resultados de cribado neonatal en la primera revisión del niño/a. Valoración del lenguaje y audición en, al menos, 4 controles.
- ≠≠ Detección precoz de Anomalías oculares y de la visión: exploración en controles habituales hasta los 4 años y cada 2 años entre 4 y 14 años.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad: Metabolopatías 0-2 meses, Displasia de cadera y Criptorquidia (niños): 0-12 meses
Alteraciones de la Audición: 0-6 años.
Anomalías de la visión: 0-14

POBLACION DIANA

Población 0-2 meses: Metabolopatías
Población de 0-12 meses: Displasia de cadera y Criptorquidia (niños)
Población de 0-6 años: Alteraciones de la Audición
Población de 0-14 años : Anomalías de los ojos y la visión

SISTEMA DE REGISTRO

OMI

INDICADORES

COBERTURA EFECTIVA

General: % niños/as con las actividades de Detección Precoz indicadas para su edad realizadas en relación a la población diana estimada
Metabolopatías: % recién nacidos con toma de muestra para metabolopatías en relación a la población diana estimada
Displasia de cadera: % niños/as de 0-12 meses con 4 exploraciones anuales en relación a la población diana estimada
Criptorquidia: % niños de 0-12 meses con 3 exploraciones anuales en relación a la población diana estimada
Alteraciones de la Audición: % niños/as de 0-6 años con cribado neonatal realizado y 4 exploraciones del lenguaje y la audición en relación a la población diana estimada
Anomalías de la visión: % niños/as de 0-4 años con 4 exploraciones oculares realizadas en relación a población diana estimada. % niños/as con medición de agudeza visual realizada en 4 ocasiones entre los 4 y 13 años en relación a la población diana estimada

CALIDAD

CONTROL DE PROCESO

RESULTADOS INTERMEDIOS

SERVICIO

DETECCION PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN POBLACION INFANTIL : METABOLOPATIAS CONGENITAS

DEFINICION

Cribaje sistemático para fenilcetonuria e hipotiroidismo en recién nacidos, con objeto de prevenir enfermedades derivadas de estos errores congénitos del metabolismo

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Según recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Servicio:

Toma de muestra de sangre sistemática a todo recién nacido entre el 3º y 8º día de vida, para determinación de TSH y fenil-alanina.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad: Primer mes de vida

POBLACION DIANA

Población de 0- 2 meses.

SISTEMA DE REGISTRO

Registro OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% recién nacidos con toma de muestra para metabolopatías en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

DETECCION PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN POBLACION INFANTIL : DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA

DEFINICION

Cribado para el diagnóstico precoz de la Displasia evolutiva de cadera con el objetivo de tratar lo más precozmente posible trastornos de la articulación coxofemoral y, mediante tratamientos lo menos cruentos posibles, evitar patología locomotor relacionada.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Servicio :

Maniobras de Ortolani y Barlow en el período neonatal precoz y Exploración de las caderas en los controles ulteriores hasta el año de edad.

Realización de estudios de imagen en los casos que lo recomiende la guía de práctica clínica

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad: 0-12 meses

POBLACION DIANA

Población de 0-12 meses.

SISTEMA DE REGISTRO

Registro OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños/as de 0-12 meses con 4 exploraciones de cadera realizadas en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

DETECCION PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN POBLACION INFANTIL: CRIPTORQUIDIA

DEFINICION

Diagnóstico precoz que permite el tratamiento temprano de esta anomalía congénita, con el objetivo prevenir la posible subfertilidad de la edad adulta.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Servicio :

Exploración de los genitales externos de los niños varones al menos 3 veces en el primer año de vida y en cualquier momento si no se hubiera efectuado con anterioridad.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad y sexo: niños varones de 0-12 meses

POBLACION DIANA

Población de niños de 0-12 meses.

SISTEMA DE REGISTRO

Registro OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños de 0-12 meses con 3 exploraciones anuales en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

DETECCION PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN POBLACION INFANTIL: ALTERACIONES DE LA AUDICION

DEFINICION

Cribado auditivo neonatal y control periódico del lenguaje y la audición con el objetivo de prevenir en lo posible patologías relacionadas con el desarrollo, el lenguaje y la audición.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Recomendaciones del Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil del Principado de Asturias
Cribado universal mediante otoemisiones acústicas a toda la población infantil antes de los 3 meses de vida
Búsqueda de antecedentes familiares y personales de indicadores de riesgo asociados a sordera neurosensorial y/o de conducción.
Valoración de la audición y la adquisición del desarrollo del lenguaje en 4 ocasiones durante los dos primeros años y a los 4 y 6 años

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad: 0-6 años

POBLACION DIANA

Población infantil de 0-6 años

SISTEMA DE REGISTRO

Registro OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños/as de 0-6 años con cribado neonatal realizado y 4 exploraciones del lenguaje y la audición en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

DETECCION PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD EN POBLACION INFANTIL: ANOMALIAS OCULARES Y DE LA VISION

DEFINICION

Detección Precoz de defectos de visión congénitos o adquiridos durante el período crítico del desarrollo visual con el objetivo de evitar en lo posible cegueras parciales o totales y trastornos de la visión y sus consecuencias sobre el desarrollo integral del niño.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica del Servicio :
Búsqueda de antecedentes familiares o personales que supongan factores de riesgo
Exploración ocular a los recién nacidos y durante la lactancia
Entre los 3 y 4 años Medición de la agudeza visual mediante optotipos infantiles y cada dos años hasta los 13 años.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad: 0-13 años

POBLACION DIANA

Población de niños/as de 0-13 años.

SISTEMA DE REGISTRO

Registro OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños/as de 0 -4 años con 4 exploraciones oculares realizadas en relación a la población diana estimada
% niños/as con medición de agudeza visual realizada en 4 ocasiones entre los 4 y 13 años en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

ATENCIÓN AL NIÑO Y ADOLESCENTE CON ASMA

DEFINICION

Atención sanitaria de captación y seguimiento protocolizado que se presta a la población infantil y adolescente con el proceso respiratorio crónico que se caracteriza por síntomas y/o signos clínicos sugerentes de limitación al flujo aéreo reversible por inflamación y/o hiperreactividad de las vías aéreas que suponen el diagnóstico médico de asma.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Existencia de Guía de actuación clínica según Programa Regional de Atención al Niño y Adolescente con Asma (PRANA), en coordinación con Atención Especializada, con criterios de inclusión, diagnóstico, clasificación de la gravedad, plan de actuación y seguimiento y criterios de derivación, incluidas pautas de educación sanitaria. Valoración protocolizada del proceso, con datos clínicos, estudios complementarios y pauta actualizada de tratamiento.

Evaluación de la gravedad del asma.

Realización de actividades de educación sanitaria.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

Código CIAP: R 96.

Grupo de edad: 0-13 años

POBLACION DIANA

11,5 % de Población de 0-13 años

Fuente: PRANA

SISTEMA DE REGISTRO

OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños/as con asma con seguimiento y evaluación de la gravedad del proceso con relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**

SERVICIO

ATENCIÓN A TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

DEFINICION

Atención sanitaria de detección precoz y seguimiento protocolizado que se presta a la población infantil con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, con el objetivo de prevenir problemas escolares y psicosociales y mejorar la atención socio-sanitaria y educativa de la población afectada.

Los síntomas más característicos o nucleares están constituidos por inatención, hiperactividad e impulsividad.

CRITERIOS/REQUISITOS MINIMO/S DE SEGUIMIENTO O PROCESO DE INCLUSION

Existencia de Guía de práctica clínica, en coordinación con Atención Especializada y otros niveles, con criterios de inclusión, diagnóstico, plan de actuación y seguimiento y criterios de derivación, incluidas pautas de educación sanitaria.

Valoración protocolizada del proceso, con datos clínicos, pauta de tratamiento y terapia de apoyo en colaboración con los centros educativos.

Realización de actividades de información, consejo y educación del niño y su familia.

CODIGO/S CIAP / GRUPO DE EDAD Y SEXO

CIAP: P 81.

Grupo de edad: 6-13 años

POBLACION DIANA

3-5% Población infantil de 6-13 años

SISTEMA DE REGISTRO

OMI

INDICADORES**COBERTURA EFECTIVA**

% niños/as con TDAH con plan de actuación en relación a la población diana estimada

CALIDAD**CONTROL DE PROCESO****RESULTADOS INTERMEDIOS**