



BUENA RESPUESTA

- Está mejor. Desaparecen los síntomas o apenas tiene tos, pitos o fatiga. Su FEM es mayor de.....



CRISIS LEVE:

Puede permanecer en su domicilio con la siguiente pauta hasta consultar con su pediatra:

- MANTENER su tratamiento DE FONDO si lo lleva.....
- Continuar con el tratamiento BRONCODILATADOR (tipo y dosis):.....
.....A DEMANDA durante 24-48 horas, esto es, según lo necesite en función de los síntomas.



- Consulte con su pediatra en 24-48 horas.
- Si empeora de nuevo pase al cuadro de la crisis moderada

RESPUESTA INCOMPLETA

- Está igual o ha mejorado poco, persisten los pitos y fatiga.
o
- Síntomas disminuyen pero reaparecen en menos de 3 horas tras el tratamiento inicial correcto.




CRISIS MODERADA:

Consulte con el médico o pediatra el mismo día, pero continúe con la siguiente pauta:

- MANTENER su tratamiento DE FONDO si lo lleva.....
- Continuar con el tratamiento BRONCODILATADOR a demanda.....
- y
- Asociar CORTICOIDES ORALES:
Dosis:.....



- Si a pesar de administrar el tratamiento anterior (broncodilatador y corticoides orales) no observa mejoría en 2-6 horas consulte inmediatamente.



MALA RESPUESTA

- Persisten síntomas o está peor a pesar del tratamiento anterior. Su FEM es menor de.....



CRISIS GRAVE:

Acuda de inmediato al Servicio de Urgencias.

Medidas hasta llegar al Servicio de Urgencias:

- Asociar CORTICOIDES ORALES si no los ha administrado antes a la dosis recomendada en el cuadro anterior.....
- Repetir BRONCODILATADORES inmediatamente a **mayor** dosis.....
- Asociar ANTICOLINÉRGICOS inhalados.....
Dosis:.....



- Transporte inmediato al Servicio de Urgencias del Centro de Salud u Hospital más próximo o si esto no es posible llame al 112