

QUERATODERMIA ACUAGÉNICA

UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE EN PEDIATRÍA

Alejandra Romano Medina, Marianela Marcos Temprano, María del Carmen Goz Sanz, Vanesa Matías del Pozo, Andrea Patricia Espinoza Leiva, María del Pilar Uribe Reina

SERVICIO DE PEDIATRÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

INTRODUCCIÓN

- Queratodermia acuagénica = patología **poco frecuente** en infancia
- **Pápulas blanquecinas** en las palmas de manos tras inmersión en agua
- **Idiopática** >>> Secundaria (fibrosis quística)

CASOS CLÍNICOS

CONSULTA DE NEUMO-ALERGIA INFANTIL



9 años

Seguimiento alergia ambiental a Alternaria



15 años

Fibrosis quística de diagnóstico en cribado neonatal



14 años

Derivada de Dermatología, descartar FQ



14 años

Derivada AP (urticaria acuagénica)

MICROPÁPULAS BLANQUECINAS EN LAS PALMAS DE LAS MANOS TRAS INMERSIÓN EN AGUA O SUDORACIÓN CON DESCAMACIÓN POSTERIOR

Diagnóstico clínico

Diagnóstico clínico

Provocación +
Test sudor -

Provocación +

Mejoría con corticoide tópico

Clorhidrato de aluminio y urea

Clorhidrato de aluminio y urea

Clorhidrato de aluminio y urea

CONCLUSIONES

- Es más frecuente en **adolescencia** que en infancia
- **DIAGNÓSTICO CLÍNICO** (características bien definidas)
- Tratamiento: **clorhidrato de aluminio y crema de urea**, buena evolución
- ¿Cribado fibrosis quística?